

EDAD	VACUNAS	DOSIS	ABREVIATURA
RECIÉN NACIDO	BCG	Única dosis	BCG
	Hepatitis B	Dosis neonatal	HB
2 MESES	Neumococo Conjugada 13 valente	1° dosis	PCV13
	Quíntuple o Pentavalente	1° dosis	DTP-HB-Hib
	IPV - Vacuna Antipoliomielítica Inactivada	1° dosis	Salk
	Rotavirus	1° dosis	-
3 MESES	Meningococo ACYW	1° dosis	MenACYW
4 MESES	Neumococo Conjugada 13 valente	2° dosis	PCV13
	Quíntuple o Pentavalente	2° dosis	DTP-HB-Hib
	IPV - Vacuna Antipoliomielítica Inactivada	2° dosis	Salk
	Rotavirus	2° dosis	-
5 MESES	Meningococo ACYW	2° dosis	MenACYW
6 MESES	Quíntuple o Pentavalente	3° dosis	DTP-HB-Hib
	IPV - Vacuna Antipoliomielítica Inactivada	3° dosis	Salk
	Antigripal (Influenza)	Dos dosis si es la primera vez que la recibe (A)	-
12 MESES	Neumococo Conjugada 13 valente	Refuerzo	PCV13
	Hepatitis A	Única dosis	-
	Triple Viral	1° dosis	SPR/MMR/TV
	Antigripal (Influenza)	Dosis Anual (B)	-
15 MESES	Meningococo ACYW	Refuerzo	MenACYW
	Varicela	1° dosis	-
	Antigripal (Influenza)	Dosis Anual (B)	-
15 A 18 MESES	Quíntuple o Pentavalente	Refuerzo	DTP-HB-Hib
	Antigripal (Influenza)	Dosis Anual (B)	-
	Fiebre Amarilla (quienes viven en zonas de riesgo)	1° dosis a los 18 meses	-
HASTA LOS 2 AÑOS	Antigripal (Influenza)	Dosis Anual (B)	-
5 AÑOS	IPV - Vacuna Antipoliomielítica Inactivada	Refuerzo	Salk
	Triple Bacteriana Celular	Refuerzo	DTP
	Triple Viral	2° dosis	SPR/MMR/TV
	Varicela	2° dosis	-
11 AÑOS	Meningococo ACYW	Única dosis	Men ACYW
	Triple Bacteriana Acelular	Refuerzo	dTpa
	Virus Papiloma Humano	Dos dosis, separadas por 6 meses	VPH/HPV
	Fiebre Amarilla (C)	Refuerzo (D)	FA

- (A) Separadas al menos por 4 semanas.
 (B) Si es la primera vez que la recibe, dos dosis separadas al menos por 4 semanas.
 (C) Toda persona entre 2 y 59 años residente en zona de riesgo debe recibir 1 dosis (consultar previamente con el equipo de salud las contraindicaciones para esta vacuna).
 (D) Residentes en zona de riesgo si la 1° dosis la recibió antes de los 2 años.